

OTITE ECZEMATOSA EM CÃO ATÓPICO: TRATAMENTO DE 5 DIAS COM EASOTIC®.



Dra. Cristiane Bazaga Botelho

INTRODUÇÃO



Um cão, macho, maltês, de 3 anos de idade e diagnóstico de dermatite atópica, foi atendido na clínica OTODERME no Rio de Janeiro. Os tutores referiam que o animal estava em tratamento e as crises atópicas controladas, exceto pela ocorrência de otites intermitentes, que vinham ocorrendo com certa frequência há pelo menos 2 anos.



ORELHA ESQUERDA



ORELHA DIREITA

EXAME FÍSICO E EXAMES COMPLEMENTARES

Ao exame físico, o animal apresentava eczema bilateral em pavilhão auricular e condutos auditivos, com presença de descamação e secreção ceruminosa. Os tutores referiam prurido intenso e meneios cefálicos.

À citologia, observou-se bilateralmente:

Cocos ++


Malassezia spp. +

DIAGNÓSTICO


Dado o histórico do animal e os achados do exame físico, concluiu-se que o animal apresentava uma otite do tipo eczematososa, sendo a inflamação causada pela dermatite atópica, e a infecção secundária.

TRATAMENTO

O tratamento proposto foi o uso do **Easotic®**, com aplicação **1 vez ao dia por 5 dias**, após limpeza prévia na própria clínica com Phisio® antiodor. Após o período de aplicação do produto, os tutores foram orientados a não mexer ou limpar as orelhas do cão, e o retorno foi feito em 15 dias.



ORELHA ESQUERDA



ORELHA DIREITA

Nota-se uma melhora acentuada do processo inflamatório (menos edema e menos eritema), e uma redução da descamação e secreção ceruminosa em ambos os condutos auditivos. À citologia de controle, o animal passou a apresentar células descamativas e raros cocos.


DISCUSSÃO

Um dos principais motivos que levam o tutor a abandonar o tratamento da otite externa, é a falta de conveniência. O tratamento dessa condição exige, por vezes, o uso de medicações tópicas, por longos períodos de tempo, em um conduto auditivo inflamado e dolorido. Caso a medicação prescrita não ofereça vantagens que tornem esse processo menos aflitivo, existe uma alta chance de que o tutor pare o tratamento ao perceber uma leve melhora, facilitando assim a seleção de micro-organismos resistentes e aumentando as chances de recidivas.

As otites externas têm uma etiopatogenia complexa, que muitas vezes envolve diferentes causas. A causa mais comum, no entanto, é a inflamatória, devido à doença alérgica. Nesses casos, a inflamação do pavilhão auricular e dos condutos auditivos leva a um aumento na produção de cerúmen e um desbalanço do microbioma, levando à infecção secundária. A infecção, por sua vez, piora a inflamação, fechando o ciclo de causa e efeito.



Dra. Cristiane Bazaga Botelho



No caso apresentado, o cão apresentava dermatite atópica, sendo essa a causa da inflamação que levava o animal a apresentar otites de repetição. Easotic® mostrou-se eficaz e seguro, fazendo um efetivo controle da infecção e do processo inflamatório.

FÓRMULA COMPLETA – TRIPLA AÇÃO



- Gentamicina: antibiótico de amplo espectro, indicado como primeira escolha empírica de antimicrobiano nas otites externas;
- Miconazol: antifúngico eficaz contra *Malassezia pachydermatis*;
- Aceponato de hidrocortisona: anti-inflamatório potente, seguro e eficaz. Menos de 0,2% atinge a corrente sanguínea, o que minimiza potenciais efeitos adversos.

TRATAMENTO DE OTITE EXTERNA EM APENAS 5 DIAS?

Easotic® é indicado 1 vez ao dia por apenas 5 dias, mas possui uma formulação exclusiva, com veículos que permitem que o produto continue ativo e aderido ao conduto auditivo por pelo menos mais 10 dias após a última aplicação, totalizando 15 dias de tratamento.




A seta indica o último dia de aplicação do Easotic®, porém nota-se que o produto continuou agindo na redução dos sinais clínicos ao longo de pelo menos mais 10 dias.

OUTRAS VANTAGENS:



Referências bibliográficas:

RIGAUT D., MAYNARD L., ROUSSEAU C. Dose titration study of a new topical ear formulation in the field 23rd ESVD-ECVD Congress Bled, 17 - 19 September 2009.
 Paterson S. Topical ear treatment - options, indications and limitations of current therapy. J Small Anim Pract. 2016 Dec;57(12):668-678.
 Nuttall T, Mueller R, Bensignor E, Verde M, Noli C, Schmidt V, Rème C. Efficacy of a 0.0584% hydrocortisone aceponate spray in the management of canine atopic dermatitis: a randomised, double blind, placebo-controlled trial. Vet Dermatol. 2009 Jun;20(3):191-8.



Você conhece o **nosso canal de podcast no Spotify?**

Aproxime o seu celular do **QR Code** e tenha acesso a mais esse **conteúdo exclusivo** da Virbac para você.